



CELECOXIB LAM[®]

Celecoxib
Vía oral

FORMULAS	CELECOXIB LAM [®] 200 mg Comprimido recubierto	CELECOXIB LAM [®] 400 mg Comprimido
Celecoxib	200 mg.	400 mg
Excipientes c.s.p	1 Comp.	1 Comp.

DESCRIPCIÓN

CELECOXIB LAM[®] es un medicamento antiinflamatorio no-esteroides que exhibe actividades analgésica y anti-pirética. El mecanismo de acción del celecoxib se cree se debe a la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, principalmente inhibición de la ciclooxigenasa (COX-2).

INDICACIONES

CELECOXIB LAM[®] está indicado en las siguientes condiciones: para el alivio de los signos y síntomas de la osteoartritis, para el alivio de los signos y síntomas de la artritis reumatoidea en adultos y en el alivio del dolor.

POSOLOGÍA

Según la dosis médica recomendada.

Osteoartritis: la dosis oral recomendada es de 200 mg. por día administrado como dosis única o dos dosis de 100 mg. cada una.

Artritis reumatoidea: la dosis oral recomendada es de 100-200 mg. dos veces al día.

Tratamiento del dolor asociado a cirugía ortopédica: Adultos dosis de 400 mg/día durante 2-5 días.

CONTRAINDICACIONES

CELECOXIB LAM[®] está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida al celecoxib, pacientes alérgicos a las sulfonamidas, a pacientes que han tenido experiencias asmáticas, urticaria o reacciones alérgicas después de haber tomado aspirina u otras drogas antiinflamatorias no-esteroides, pacientes con úlceras gástricas duodenales activas.

EFFECTOS ADVERSOS

Entre las reacciones adversas más comunes están: dolor abdominal, diarrea, dispepsia, flatulencia, náusea, edema periférico, mareos, faringitis, infecciones del tracto respiratorio superior.

INTERACCIONES

El celecoxib puede disminuir el efecto de la furosemina, tiazidas y de los inhibidores de la ECA. La administración concomitante de la aspirina y el celecoxib puede aumentar el riesgo de úlceras y otras complicaciones gastrointestinales. La administración concomitante de fluconazol en concentración de 200 mg. aumenta la concentración plasmática del celecoxib. El celecoxib aumenta los niveles plasmáticos del litio.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Efectos gastrointestinales serios como sangrado, ulceraciones y perforaciones del estómago, intestino delgado y grueso pueden ocurrir en cualquier momento con o sin mostrar síntomas, en pacientes tratados con drogas antiinflamatorias no-esteroides. El uso de celecoxib en paciente con enfermedad avanzada del riñón no está recomendado. En los embarazos en término, este fármaco debe evitarse, debido a que puede causar estrechamiento prematuro del ducto arterioso.

Pacientes que presenten disfunción hepática, deben ser monitoreados cuidadosamente mientras estén recibiendo **CELECOXIB LAM[®]**. La administración a largo plazo de drogas antiinflamatorias no-esteroides

puede inducir a una necrosis papilar y a otros daños renales. Precauciones deben ser tomadas cuando se inicia un tratamiento con celecoxib en pacientes con considerable deshidratación. Pacientes con tratamientos a largo plazo deben monitorear su hemoglobina y hematocrito si presentan algún signo o síntoma de anemia o pérdida de sangre. El celecoxib no afecta el conteo de plaquetas, el tiempo de protrombina y no provoca la inhibición de la agregación plaquetaria en las dosis indicadas. El celecoxib es una droga antiinflamatoria no-esteroidea por lo tanto su uso en los pacientes con asma sensible a aspirina debe ser evitado.

MEDIDAS ADOPTADAS EN CASO DE INTOXICACIÓN

En caso de intoxicación acudir al centro médico más cercano. Los efectos que se verifican al momento de una sobredosis son: mareos, dolor estomacal, diarrea. Si los síntomas persisten favor acudir al centro de atención en salud más cercano.

PRESENTACIONES

CELECOXIB LAM® 200 mg: se presenta en caja conteniendo 30 comprimidos recubiertos.

CELECOXIB LAM® 400 mg: se presenta en caja conteniendo 30 comprimidos.

CONSERVACIÓN: Protéjase de la luz. Conservar a temperatura ambiente entre 15 °C- 30 °C. Protegido de la humedad.

LEYENDA DE PROTECCIÓN

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. Venta bajo receta médica.

FABRICANTE

Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.A. Santo Domingo, República Dominicana.

