

**Ambroxol Lam®**Ambroxol HCL  
Via oral**FÓRMULA****Ambroxol Lam®**  
Jarabe

|                |       |
|----------------|-------|
| Ambroxol HCL   | 15 mg |
| Vehículo c.s.p | 5 mL  |

**DESCRIPCIÓN:**

El ambroxol, es un fármaco que está dentro de la categoría de los medicamentos mucolíticos. Es un metabolito de la bromhexina, el ambroxol es un fármaco útil en procesos bronquiales donde se requiere la expulsión de flemas para evitar el estancamiento del moco espeso en los alveolos pulmonares. Puede usarse solo (monofármaco) o en combinación con un broncodilatador.

**INDICACIONES:**

Está indicado en todas aquellas enfermedades respiratorias que cursen con secreción de moco patológico: bronquitis aguda, bronquitis crónica, bronconeumonía, neumonía, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), bronquiectasias, traqueobronquitis, asma bronquial cuando haya retención de secreciones en el árbol bronquial, bronquitis asmátiforme, Sinusitis, otitis. Afectación pulmonar por drogas empleadas en quimioterapia tóxicos.

**POSOLOGÍA:**

Niños menores de 2 años: Ambroxol 2.5 mL una o dos veces al día bajo estricta supervisión médica.

Niños 2 - 5 años: Ambroxol: 2.5 mL tres veces al día.

Niños > 5 años: Ambroxol: 5 mL dos o tres veces al día.

Adultos: Ambroxol: 5 mL tres veces al día por 2-3 días, y luego 2.5 mL tres veces al día. Ambroxol 10 mL tres veces al día por 2-3 días, y luego 5 mL tres veces al día.

**CONTRAINDICACIONES:**

Hipersensibilidad al ambroxol o a cualquiera de los componentes del producto. Hipersensibilidad a la bromhexina, úlcera péptica, embarazo (durante el primer trimestre) insuficiencia renal severa, insuficiencia hepática severa, tratamiento con anticoagulantes.

**EFFECTOS ADVERSOS:**

Los efectos adversos más frecuentes del ambroxol son: náuseas, dolor abdominal, vómitos, fiebre y diarrea. Si se administra en forma de aerosol a pacientes asmáticos puede provocar episodios de broncoespasmo, que pueden prevenirse administrando previamente un broncodilatador. Con menos frecuencia se ha encontrado erupción cutánea, sequedad de vías respiratorias, rinorrea, estreñimiento o disuria.

**INTERACCIONES:**

La administración de ambroxol con antibióticos (amoxicilina, cefuroxima, macrólidos) durante el tratamiento de infecciones respiratorias puede aumentar la concentración del fármaco en el tejido pulmonar. El uso concomitante con antitusígenos podría provocar la acumulación de secreciones respiratorias por inhibición del reflejo tusígeno.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:**

Los niños menores de 2 años deben recibir ambroxol bajo supervisión médica. Pacientes con insuficiencia renal o enfermedad hepática deberían reducir la dosis o aumentar el intervalo de administración de ambroxol. Pacientes con el síndrome ciliar maligno podrían tener congestión por secreciones respiratorias. El uso concomitante con antitusígenos podría provocar la acumulación de secreciones respiratorias por inhibición del reflejo tusígeno. Lo mismo podría suceder en pacientes con compromiso neurológico de cualquier causa o con desórdenes neuromusculares. Los pacientes con antecedentes de úlcera péptica o trastornos convulsivos deberán recibir ambroxol con precaución.

Aunque no se ha demostrado que tenga acción teratogénica en animales, no se recomienda el uso de ambroxol en el primer trimestre del embarazo. No se han realizado estudios suficientes en humanos para ver si se distribuye en la leche materna. Su uso no se recomienda durante la lactancia.

**MEDIDAS ADOPTADAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:**

Puede producir irritación faríngea o del tracto digestivo superior, dolor abdominal, náusea, vómito o diarrea. El tratamiento, además de las medidas de descontaminación gastrointestinal que se consideren pertinentes, es de soporte y de vigilancia de la función respiratoria. La diálisis no debería ser efectiva.

**PRESENTACIÓN:**

**Ambroxol Lam®:** se presenta en frasco conteniendo 120 mL de jarabe.

**CONSERVACIÓN:**

Protéjase de la luz. Conservar a temperatura ambiente entre 15°C- 30°C.

**LEYENDA DE PROTECCIÓN:**

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. Venta sin receta médica.

GENÉRICOS  
LAM

Fabricado por: Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.R.L. LAM  
Santo Domingo, República Dominicana.

**APROBACIÓN DE ARTE GRÁFICO**

DOCUMENTO NO.: FOR-IN-002

DOC. RELACIONADO: SOP-IN-001

VERSION: 00

FECHA DE EMISION: 29/05/2019

ULTIMA REVISION: 30/05/2019

EFECTIVO DESDE 30/05/2019

REGISTRO INDUSTRIAL: RD-14-00608

**DATOS DEL MATERIAL:**

TROQUEL NO.: N/A

TIPO DE MATERIAL: N/A

**PANTONES:**

 EMPAQUE ORIGINAL EMPAQUE MUESTRA MEDICA**CORRECCIONES U OBSERVACIONES:**




**Realizado por: Diseñador Gráfico:**

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

**Verificado por: Director Médico, Gte. de Línea ó Director de Desarrollo e Inteligencia de Neg.**

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

**Gerente de Aseguramiento de la Calidad**

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

PARA USO EXCLUSIVO DE  
LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS (LAM)

FRENTE:

5.19 pulg

DORSO: