



ACICLOVIR LAM[®]

Aciclovir

Vía oral

FÓRMULA	ACICLOVIR LAM [®] 800 mg Tableta
Aciclovir	800 mg
Excipientes C.S.P	1 Capleta

DESCRIPCIÓN

El aciclovir es el primer nucleósido purínico sintético con una actividad in vitro e in vivo inhibitoria de los virus herpes humanos incluyendo el virus herpes simple tipos 1 (HSV-1) y 2 (HSV-2), virus zoster de la varicela (VZV), virus de Epstein-Barr (EBV) y citomegalovirus (CMV). Los cultivos de células, el aciclovir muestra la mayor actividad frente al HSV-1, seguidos del HSV-2, VZV, EBV y CMV.

INDICACIONES

Está indicado en las infecciones producidas por herpes simple tipo 1 y 2: estomatitis herpética, herpes labial, herpes genital, queratitis, encefalitis, tanto en su primera aparición como en recurrencias. El Aciclovir se usa también en las infecciones producidas por el virus de la varicela zoster (VZV), tanto en la varicela como en el herpes zóster o culebrilla, especialmente en el caso de que se produzca neuritis o en pacientes inmuno-deprimidos, siempre y cuando se use precozmente. Cuanto antes se inicia el tratamiento, mayores son los beneficios terapéuticos, especialmente si se comienza su uso, durante sus primeros síntomas.

POSOLOGÍA

2 a 5 veces al día, o según las indicaciones de su médico.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida al principio activo.

EFFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos del aciclovir suelen ser poco frecuentes y leves. El uso oral del aciclovir puede provocar cefalea, náuseas, diarrea.

INTERACCIONES

El uso concomitante con probenecid prolonga la vida media del aciclovir y aumenta el potencial de toxicidad sobre el SNC. El interferón y metotrexato pueden favorecer la aparición de alteraciones neurológicas. En pacientes con daño renal se debe evaluar su uso concomitante con medicamentos nefrotóxicos. Con el uso tópico de aciclovir hasta la fecha no se han reportado.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

En pacientes con alteración de la función renal, se reducirá la dosis diaria.

Se deben evitar las relaciones sexuales de pacientes de herpes genital con lesiones visibles, ya que existe el riesgo de transmitir la infección a la pareja.

Debe realizarse un riguroso control clínico en pacientes con historial de epilepsia o reacciones neurológicas a otros medicamentos, así como en aquellos con deshidratación y/o insuficiencia renal, siendo necesario en estos últimos ajustar la posología.

Embarazo y lactancia: El aciclovir sólo se utilizará en aquellos casos en los que previamente la valoración riesgo-beneficio de su aplicación aconseje su utilización.

Lactancia: Estudios han demostrado la presencia de aciclovir en la leche materna.

MEDIDAS ADOPTADAS EN CASO DE INTOXICACIÓN

En caso de intoxicación acudir al centro médico más cercano.

Aun a dosis de 5 g por vía oral es poco probable que se presenten efectos tóxicos y hasta el momento no se han reportado casos de ingestiones superiores.

La hemodiálisis es un recurso importante que puede remover hasta 60% de la dosis administrada. En caso de sobredosificación diríjase a una emergencia médica.

PRESENTACIÓN

ACICLOVIR LAM® 800 mg: se presenta en caja conteniendo 30 capletas.

CONSERVACIÓN

Consérvese a temperatura inferior de 25°C en un lugar seco y fresco.

LEYENDA DE PROTECCIÓN

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. Venta bajo receta médica. No se administre durante el Embarazo y la lactancia.

FABRICADO POR:

Laboratorios Dr. Collado S.A. Sto. Dgo. R.D.

PARA:

Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.R.L. Santo Domingo República Dominicana.

