

ANGIDOL®

Lidocaina HCl/ Cloruro de Decualinio

Vía oral



FÓRMULA	ANGIDOL® 1/0.25 Comprimido para chupar	ANGIDOL® 1/1 Comprimido para chupar
Lidocaina HCl	1 mg.	1 mg
Cloruro de Decualinio	0.25 mg	1 mg
Excipientes c.s.p	1 Comp.	1 Comp.

DESCRIPCIÓN

ANGIDOL® contiene Lidocaina que es un anestésico local y Decualinio que es un antibacteriano y antimicótico.

La **lidocaina** produce sus efectos anestésicos mediante el bloqueo reversible de la conducción nerviosa al disminuir la permeabilidad de la membrana del nervio al sodio, al igual que afecta a la permeabilidad de sodio en las células del miocardio. Esta acción disminuye la tasa de despolarización de la membrana, lo que aumenta el umbral para la excitabilidad eléctrica. El bloqueo afecta a todas las fibras nerviosas en el siguiente orden: autonómicas, sensoriales y motoras, con la disminución de los efectos en el orden inverso. La pérdida de la función nerviosa clínicamente es la siguiente: el dolor, la temperatura, el tacto, la propiocepción y el tono del músculo esquelético. Es necesaria una penetración directa en membrana nerviosa para la anestesia efectiva, lo que se consigue mediante la aplicación tópica o la inyección por vía subcutánea, intradérmica, o submucosa alrededor de los troncos nerviosos o ganglios que abastecen el área a ser anestesiada.

El **Cloruro de Decualinio** posee únicamente un efecto tópico, ya que no es absorbido ni por la membrana de la mucosa de la boca, ni por la mucosa del tracto gastrointestinal.

INDICACIONES

Está indicado en las inflamaciones e infecciones de la cavidad bucofaríngea aguda y crónica, como en casos de dolor de garganta, así como coadyuvante de la amigdalitis.

POSOLOGÍA

En adultos una aplicación de un comprimido para chupar cada 3-6 horas o según requerimiento del médico. Colocar sobre la lengua y chuparlo hasta completa desintegración. No tomar líquidos ni ingerir comida hasta no haber disuelto todo el comprimido.

Para la administración en niños consultar con su médico.

CONTRAINDICACIONES

Está contraindicado ante hipersensibilidad por alguno de sus componentes. En casos de Heridas recientes, lesiones tuberculosas cutáneas, herpes simple, hipersensibilidad, varicela.

Embarazo:

Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia: Por ser un medicamento de aplicación tópica y de escasa absorción, no se han llevado a cabo estudios durante el embarazo y la lactancia.

EFFECTOS ADVERSOS

Los fenómenos de toxicidad y de irritación local son mínimos.

INTERACCIONES

No se conocen hasta la fecha.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Precauciones en relación con efectos de carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis y sobre la fertilidad: Dado que la vía de administración de este es tópica sobre la orofaringe, hasta el momento no se encuentran datos.

MEDIDAS ADOPTADAS EN CASO DE INTOXICACIÓN

En caso de intoxicación acudir al centro médico más cercano.

Hasta la fecha no se ha comunicado ningún dato de sobredosificación.

PRESENTACIONES

ANGIDOL® 1/0.25: se presenta en cajas conteniendo 24 y 100 comprimidos para chupar.

ANGIDOL® 1/1: se presenta en cajas conteniendo 24 y 100 comprimidos para chupar.

CONSERVACIÓN: Protéjase de la luz. Conservar a temperatura ambiente entre 15 °C- 30 °C. Protegido de la humedad

LEYENDA DE PROTECCIÓN

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. Venta libre sin receta médica.

FABRICANTE

Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.A., Santo Domingo, República Dominicana.

