



FLORELIX®

Extracto seco de Hedera Helix

Vía oral

FÓRMULA	FLORELIX® Jarabe
Extracto seco de Hedera Helix	35 mg
Vehículo c.s.p	5 mL

DESCRIPCIÓN

La Hedera Helix se ha empleado y continúa usándose en afecciones de vías respiratorias altas, en el tratamiento sintomático de bronquitis crónicas e incluso en casos de tos rebelde con vómitos. Las hojas se utilizan como expectorantes, antiespasmódicas, antineurálgicas y vasoconstrictoras.

Las preparaciones de **FLORELIX®** contienen extracto de hojas de hiedra desecadas, cuyo efecto terapéutico en enfermedades de las vías aéreas se debe a las propiedades secretolíticas, espasmolíticas y antitusivas de las saponinas del grupo glucósidos que este producto contiene.

Su mecanismo de acción se basa en la estimulación de los receptores β 2-adrenérgicos localizados en la superficie de la célula bronquial y esto desencadena en el epitelio pulmonar un aumento en la producción de surfactante y por ello la reducción de la viscosidad del moco y en la célula músculo bronquial disminuye la concentración intracelular del calcio resultando una dilatación de la musculatura bronquial (espasmólisis) y permitiendo el intercambio gaseoso.

El efecto secretolítico del extracto se debe esencialmente a la naturaleza de las saponinas de los hederagucósidos, en tanto se considera que los efectos parasimpaticolíticos de ciertos glucósidos son la base de las propiedades espasmolíticas que se ejercen particularmente en los bronquios inflamados.

INDICACIONES

En infecciones agudas y crónicas de las vías respiratorias, acompañadas de tos y aumento en la producción de moco.

POSOLOGÍA

Lactantes y niños pequeños: ½ cucharada (2.5 ml) 3 veces por día.

Niños en edad escolar y adolescentes: 1 cucharada (5 ml) 3 veces por día.

Adultos: 5 a 7.5 ml 3 veces por día.

Agitar bien el frasco antes de usar.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes con intolerancia a la fructosa ya que contiene sorbitol en la fórmula y esta se convierte en fructosa en el intestino. El tratamiento sólo debe realizarse después de consultar con un médico.

EFFECTOS ADVERSOS

En casos raros, **FLORELIX** puede tener un efecto laxante debido al contenido de sorbitol en el producto.

INTERACCIONES

No se conocen efectos adversos en el caso de ingestión simultánea de **FLORELIX®** y otros medicamentos. Por lo tanto, este preparado puede combinarse en forma segura con otros medicamentos como, por ejemplo, antibióticos.

Alteraciones en los resultados de pruebas de laboratorio: Hasta el momento se desconocen.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Precauciones en relación con efectos de carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis y sobre la fertilidad:

Los estudios de toxicidad realizados llevan a la conclusión de que el extracto de Hedera hélix no presenta efectos carcinogénicos, mutagénicos, teratogénicos ni sobre la fertilidad.

MEDIDAS ADOPTADAS EN CASO DE INTOXICACIÓN

En caso de intoxicación acudir al centro médico más cercano.

En el caso improbable de una intoxicación es suficiente el tratamiento sintomático y de soporte. Si se ha comido un gran número de frutos, debería inducirse el vómito con un agente adecuado (jarabe de ipecacuana).

PRESENTACIONES

FLORELIX®: se presenta en caja conteniendo frasco de 120 mL.

CONSERVACIÓN

Protéjase de la luz. Conservar a temperatura ambiente entre 15°C- 30°C.

LEYENDA DE PROTECCIÓN

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. Venta libre sin receta médica.

FABRICANTE

Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.A. Santo Domingo, República Dominicana.

