



# FLUTAMID®

Flutamida

Vía oral

FÓRMULA	FLUTAMID® 250 Comprimido
Flutamida	250 mg
Excipientes C.S.P	1 Comprimido

## DESCRIPCIÓN

Este medicamento contiene un agente antiandrógeno no esteroideo que carece de otra actividad hormonal. Induce la regresión de tejidos efectores de los andrógenos como próstata y vesículas seminales, mediante el bloqueo de los receptores androgénicos periféricamente.

## INDICACIONES

**FLUTAMID®** es un compuesto antiandrógeno puro, por lo que su principal uso terapéutico es en el tratamiento de la neoplasia prostática. Pubertad precoz en los niños, así como la inhibición del impulso sexual en hombres que cometen delitos sexuales.

## POSOLOGÍA

La dosis usual es de 1 comprimido de Flutamida tres veces al día cada 8 horas, para el tratamiento del carcinoma metastático de próstata.

## CONTRAINDICACIONES

Está contraindicado en pacientes que presentan hipersensibilidad a algunos componentes de la fórmula. La flutamida está contraindicada en pacientes con enfermedad hepática grave.

## EFFECTOS ADVERSOS

Dolor epigástrico, náuseas, vómitos, diarrea, insomnio, acidez gástrica y alteraciones hepáticas, puede producirse ginecomastia. Los efectos adversos más comunes atribuidos a esta molécula son debido a su acción antiandrogénica e incluyen disminución de la libido, impotencia y sofocos. Estas reacciones adversas se asocian con concentraciones de andrógenos séricos bajos y por lo general están relacionados con la terapia con agonistas LHRH.

## INTERACCIONES

Se han incrementado los tiempos de protrombina en los pacientes estabilizados con warfarina o cuando se administró flutamida. Puede ser necesario un ajuste de la dosis de anticoagulante durante la terapia con flutamida.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Uso solo indicado en pacientes del sexo masculino.

## MEDIDAS ADOPTADAS EN CASO DE INTOXICACIÓN

En caso de intoxicación acudir al centro médico más cercano. Como la flutamida se conjuga de forma potente a las proteínas, la diálisis puede no ser de utilidad alguna como tratamiento de la sobredosis. Como es el caso en el tratamiento de sobredosis con cualquier fármaco, debe recordarse que el paciente puede haber tomado múltiples agentes. Si el paciente se encuentra alerta y no ha ocurrido el vómito espontáneamente, éste debe inducirse. Se indica el cuidado coadyuvante general, con inclusión de vigilancia frecuente de los signos vitales y observación estrecha del paciente.

## PRESENTACIONES

**FLUTAMID® 250:** se presenta en caja conteniendo 30 comprimidos y frasco conteniendo 50 comprimidos.

## CONSERVACIÓN

Protéjase de la luz. Conservar a temperatura ambiente entre 15°C- 30°C. Protegido de la humedad.

## LEYENDA DE PROTECCIÓN

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. Venta bajo receta médica.

**FABRICANTE**

Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.R.L. Santo Domingo, República Dominicana.

