



METOPRAM[®]

Metoclopramida
Vía oral

FÓRMULA	METOPRAM [®] Jarabe
Metoclopramida HCl equivalente a Metoclopramida Base	10 mg
Vehículo C.S.P	5 mL

DESCRIPCIÓN

La metoclopramida es un fármaco gastrocinético con propiedades antieméticas. Acelera el vaciamiento gástrico, acelera el tránsito del contenido intestinal, desde el duodeno hasta la válvula ileocecal, sin efecto sobre el colon, Prevención o disminución de náuseas y vómitos.

INDICACIONES

En trastornos de la motilidad gastrointestinal, En hipo, náuseas y vómito, Pesadez, meteorismo y aerofagia.

POSOLOGÍA

Adultos: 2 cucharaditas (10 ml) 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas o al acostarse.

Niños De 5 a 14 años: 1/2 ó 1 cucharadita 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

Niños De 2 a 5 años: 1 ó 2 goteros 2 ó 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

Niños De 1 a 2 años: 1/2 ó 1 gotero 2 ó 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

Niños Menores de 1 año: 1/2 ó 1 gotero 2 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

CONTRAINDICACIONES

Oclusión intestinal, apendicitis aguda. Hipersensibilidad a la Metoclopramida. Oclusión intestinal, perforación o cualquier otra condición en la que el aumento de la motilidad gastrointestinal sea riesgoso.

Apendicitis aguda, síndrome extrapiramidal.

EFFECTOS ADVERSOS

En pocos pacientes aparece fatiga, lasitud y somnolencia. Pueden aparecer reacciones distónicas y efectos extrapiramidales.

INTERACCIONES

No es recomendable administrar metoclopramida asociada a anticolinérgicos.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Cuando se administra Metoclopramida en forma conjunta con psicotrópicos, antihistamínicos o barbitúricos, se debe tener en cuenta que puede producir efectos depresivos adicionales en el SNC, igualmente cuando se consume alcohol en forma concomitante con el medicamento. Cuando se utiliza la vía parenteral, si el medicamento se aplica en forma rápida se pueden llegar a provocar síntomas extrapiramidales (tortícolis, trismos, crisis oculógiras), que son reversibles al suspender el medicamento o bien ceden con la administración de diazepam o difenhidramina. En la literatura internacional la aparición de síntomas extrapiramidales con la administración de Metoclopramida a dosis terapéuticas es de 1 en 33 000 pacientes. En pacientes con insuficiencia renal crónica, se debe valorar la administración del fármaco por periodos prolongados debido a que su eliminación es por vía renal en un 98% y en caso necesario se ajustará la dosis del medicamento.

MEDIDAS ADOPTADAS EN CASO DE INTOXICACIÓN

En caso de intoxicación acudir al centro médico más cercano.

Los síntomas de Sobre dosificación son sedación, mareo, reacciones extrapiramidales (tortícolis, trismos, crisis oculógiras). Estos síntomas son reversibles al ajustar la dosis o suspender la medicación. El tratamiento

en caso de sobredosis se basa en la administración de drogas anticolinérgicas o drogas antihistamínicas con propiedades anticolinérgicas.

PRESENTACIÓN

METOPRAM®: se presenta en caja con frasco de 120 ml e inserto.

CONSERVACIÓN

Consérvese a temperatura inferior de 30°C, en lugar fresco y seco.

LEYENDA DE PROTECCIÓN

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. Venta bajo receta médica.

FABRICADO POR:

Laboratorios Dr. Collado S.A. Sto. Dgo. R.D.

PARA:

Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.R.L. Santo Domingo República Dominicana.

