



MUCOLAM[®] COMPOSITUM

Ambroxol HCl / Clenbuterol HCl

Vía oral

| FÓRMULA | MUCOLAM [®] COMPOSITUM Jarabe |
|-----------------|---|
| Ambroxol HCl | 7.5 mg |
| Clenbuterol HCl | 0.005 mg |
| Vehículo c.s.p | 5 mL |

DESCRIPCIÓN

MUCOLAM[®] COMPOSITUM es un expectorante-broncodilatador usado en los procesos bronco-pulmonares ya que actúa sobre las secreciones bronquiales fragmentando y disgregando su organización filamentosas, acción que se manifiesta por aumento del volumen y la disminución de la viscosidad del esputo. El Clenbuterol presente en la formulación es un broncodilatador usado en el tratamiento de la obstrucción reversible de las vías aéreas y en algunos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

INDICACIONES

MUCOLAM[®] COMPOSITUM está indicado en casos de bronquitis aguda, espasmódica, crónica, neumonía, bronconeumonía, sinusitis, otitis media, asma bronquial y rinitis. En todo los casos para facilitar la expectoración y eliminar el bronco-espasmo.

POSOLOGÍA

Adultos: 4 cucharaditas (20 mL) dos veces al día.

Niños de 6-12 años: 3 cucharaditas (15 mL) dos veces al día.

Niños de 4-6 años: 2 cucharaditas (10 mL) dos veces al día.

Niños de 2-4 años: una cucharadita y media (7.5 mL) dos veces al día.

Niños de 8 meses a 2 años: una cucharadita (5 mL) dos veces al día.

Niños hasta 8 meses: media cucharadita (2.5 mL) dos veces al día.

CONTRAINDICACIONES

En casos de hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, úlcera péptica (debido a los derivados de la acetilcisteína), embarazo, estenosis subvalvular aórtica idiopática, taquiarritmias, tirototoxicosis.

EFFECTOS ADVERSOS

MUCOLAM[®] COMPOSITUM presenta reacciones adversas que son poco frecuentes y entre las más comunes están: náuseas, vómitos, diarreas, cefaleas. Otras reacciones que ocurren raramente son las reacciones alérgicas. Debido al Clenbuterol se pueden presentar temblores, taquicardia o palpitaciones por lo que se recomienda disminuir la dosis.

INTERACCIONES

Los beta-bloqueadores pueden contrarrestar los efectos del Clenbuterol y viceversa.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Se deben eliminar las secreciones para evitar la acumulación excesiva, así como también se deberán evitar los olores fuertes que produzcan náuseas.

MEDIDAS ADOPTADAS EN CASO DE INTOXICACIÓN

En caso de intoxicación acudir al centro médico más cercano.

Los síntomas de una intoxicación son dados por el clenbuterol, ya que el ambroxol no tiene ninguno reportado. Dentro de ellos se tienen: temblor en las manos, inquietud, excitación, ligera disminución de la presión arterial sistólica y diastólica, taquicardia refleja y palpitación. El tratamiento para estos estados es utilizar un betabloqueador y los síntomas desaparecerán inmediatamente.

PRESENTACIONES

MUCOLAM[®] COMPOSITUM: se presenta en caja conteniendo frasco de 120 mL.

CONSERVACIÓN

Protéjase de la luz. Conservar a temperatura ambiente entre 15°C- 30°C.

LEYENDA DE PROTECCIÓN

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. Venta bajo receta médica.

FABRICANTE

Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.R.L. Santo Domingo, República Dominicana.

