



NITRICOR®

Mononitrato de Isosorbide
Vía oral

FÓRMULAS	NITRICOR® 20 Tableta	NITRICOR® 40 Tableta
Mononitrato de Isosorbide	20 mg	40 mg
Excipientes C.S.P	1 Tableta	1 Tableta

DESCRIPCIÓN

Mononitrato de Isosorbide pertenece a un grupo de medicamentos conocidos como nitratos que poseen propiedades vasodilatadoras de las arterias coronarias del corazón (arterias que irrigan el tejido muscular del corazón).

INDICACIONES

Está indicado para el tratamiento de trastornos cardiacos tales como:

- Tratamiento a largo plazo de los trastornos de la circulación coronaria (Cardiopatía coronaria)
- Prevención de los ataques de angina de pecho (Dolor cardiaco)
- Tratamiento posterior del infarto de miocardio en caso de molestia de angina de pecho existente.
- Hipertensión pulmonar
- Tratamiento de la insuficiencia cardiaca crónica grave en combinación con glucósidos cardiacos y/o preparados diuréticos.

POSOLOGÍA

La dosis recomendada es de 20 mg dos veces al día con un intervalo de 7 horas. Para la mayoría de los pacientes puede ser recomendable tomar la primera tableta al levantarse y la segunda dosis 7 horas más tarde.

CONTRAINDICACIONES

Está contraindicado en los casos de hipersensibilidad a los nitratos, Estado de Shock, Hipotensión arterial extrema, Miocardiopatía obstructiva, Pericarditis.

EFFECTOS ADVERSOS

Reacciones secundarias frecuentes, cefáleas, mareos, náuseas con vómitos, otros efectos menos frecuentes son: Angina de Pecho, arritmia, Hipotensión, palpitaciones, Pruritos, Rash, dolor abdominal, ansiedad, agitación, visión borrosa, insomnio, pesadillas y en casos aislados: Bradicardia, Pérdida súbita de la conciencia.

INTERACCIONES

Debe evitarse la combinación de Isosorbide con otros vasodilatadores.

Con el alcohol muestra una especial forma de efectos aditivos.

Los efectos del Isosorbide pueden incrementarse al combinarlo con Betabloqueadores, antagonistas de los canales del calcio y con los antidepresivos tricíclicos.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Este medicamento puede modificar la capacidad de reaccionar del paciente, de forma tal que afecte su actitud para la participación de manejos de vehículos, maquinarias de precisión y otras maniobras riesgosas. No debe ingerir alcohol mientras está en tratamiento con Isosorbide.

MEDIDAS ADOPTADAS EN CASO DE INTOXICACIÓN

En caso de intoxicación acudir al centro médico más cercano.

La sintomatología puede aliviarse poniendo al paciente en posición supina con elevación de las piernas. Debe ajustarse la dosis o espaciar la toma.

PRESENTACIONES

NITRICOR® 20: se presenta en caja conteniendo 30 tabletas.

NITRICOR® 40: se presenta en caja conteniendo 30 tabletas.

CONSERVACIÓN

Consérvese a temperatura inferior de 30°C en lugar seco y fresco.

LEYENDA DE PROTECCIÓN

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. Venta bajo receta médica.

FABRICADO POR:

Laboratorios Dr. Collado S.A. Sto. Dgo. R.D.

PARA:

Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.R.L. Santo Domingo República Dominicana.

