



QUINFAZOL® PLUS

Albendazol / Quinfamida

Vía oral

FÓRMULA	QUINFAZOL® PLUS Comprimido
Albendazol	200 mg
Quinfamida	150 mg
Excipientes C.S.P	1 Comp.

DESCRIPCIÓN

QUINFAZOL® PLUS contiene Albendazol que es un carbamato benzoimidazólico con efectos antihelmínticos y antiprotozoarios frente a los parásitos tisulares e intestinales. El albendazol muestra actividad larvicida, ovicida y vermícida, y se cree que ejerce el efecto antihelmíntico inhibiendo la polimerización de la tubulina. Esto causa la disrupción del metabolismo del helminto, incluyendo la disminución de energía, que inmoviliza y después mata el helminto sensible. El albendazol es eficaz en el tratamiento de parásitos tisulares como *Echinococcus granulosus* y *Echinococcus multilocularis*, causantes respectivamente de la equinococosis quística y de la equinococosis alveolar. El albendazol también es efectivo en los tratamientos de la neurocisticercosis, causada por la infección de *Taenia solium*. El albendazol ha mostrado (en ensayos clínicos) que erradica quistes o reduce significativamente el tamaño de los quistes hasta en un 80% de los pacientes con quistes producidos por *Echinococcus granulosus*. En los casos en los que se ha investigado la viabilidad de los quistes después del tratamiento con albendazol, el 90% han resultado no viables en el laboratorio o en estudios con animales, en comparación con sólo el 10% de los quistes no tratados. La experiencia clínica con albendazol, muestra que, en el tratamiento de los quistes debidos a *Echinococcus multilocularis* con albendazol, una minoría de pacientes se consideraron curados y una mayoría mejoraron o estabilizaron la enfermedad.

Se asocia con la Quinfamida que es un agente antiparasitario-antiamebiásico que actúa sobre las formas móviles de *Entamoeba histolytica* en la luz intestinal. Se emplea para el tratamiento y la profilaxis de la amebiasis intestinal tanto en sus formas agudas como en el portador asintomático. Esta asociación conlleva a un mayor espectro de acción.

INDICACIONES

QUINFAZOL® PLUS está indicado en la amebiasis intestinal aguda o disentería amebiana causada por *Entamoeba histolytica*. Giardiasis causada por *Giardia intestinalis* (lamblia). *Enterobius vermicularis*. *Ascaris lumbricoides*. *Strongyloides stercoralis*. *Necator americanus*. *Ancilostoma duodenale*. *Trichuris trichiura*. *Taenia saginata*. *Taenia solium*. *Hymenolepis nana*.

POSOLOGÍA

QUINFAZOL® PLUS se administra en adultos y niños mayores de 12 años dos comprimidos como dosis única (400 mg de albendazol, quinfamida 300 mg).

Esta dosificación se administra solamente un día. El médico, si así lo considera, podrá prescribir la misma dosificación a los 3 días o más después del primer tratamiento.

Tomar con suficiente líquido y antes o después de ingerir alimentos para mayor absorción del fármaco.

CONTRAINDICACIONES

Contraindicado en pacientes que cursen con hipersensibilidad a la quinfamida o a los derivados del acetilquinolínol, en amebiasis extraintestinal, disentería amebiana severa, embarazo, lactancia en aquellos pacientes con hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Niños menores de 2 años de edad.

EFFECTOS ADVERSOS

En algunos pacientes que han recibido tratamiento con quinfamida, se han observado los siguientes efectos: cefalea, náuseas y dolor abdominal, los cuales han sido de leve intensidad y transitorios. También se ha reportado raramente cefalea y vértigo.

INTERACCIONES

Hasta el momento no existen datos de interacción de la quinfamida con otros fármacos. El prazicuantel incrementa los niveles plasmáticos del albendazol.

Alteraciones en los resultados de pruebas de laboratorio: No existen datos de alteraciones en pruebas de laboratorio con el uso de la quinfamida.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia: A la fecha no existen datos sobre la seguridad de la quinfamida en el embarazo y la lactancia, por lo tanto, deberán evaluarse los beneficios contra los posibles riesgos al utilizar el fármaco en estas condiciones. Se sabe que el albendazol es teratogénico y embriotóxico en ratones y conejos, por lo tanto, no debe ser administrado durante el embarazo. En mujeres en edad de concebir, debe administrarse dentro de los siete días del inicio de la menstruación o después de contar con una prueba negativa de embarazo y aconsejar tomar precauciones anticonceptivas durante un mes después de haber completado el tratamiento. Se desconoce si el albendazol o sus metabolitos se excretan en la leche materna humana. Por lo tanto, el albendazol no debe ser utilizado durante la lactancia a menos que se considere que los beneficios potenciales sobrepasan a los posibles riesgos asociados con el tratamiento.

MEDIDAS ADOPTADAS EN CASO DE INTOXICACIÓN

En caso de intoxicación acudir al centro médico más cercano.

En caso de sobredosificación deberán tomarse medidas de control como observación estrecha del paciente, medidas sintomáticas (lavado gástrico) y tratamiento general de apoyo.

PRESENTACIONES

QUINFAZOL® PLUS: se presenta en caja conteniendo 2 comprimidos.

CONSERVACIÓN

Protéjase de la luz. Conservar a temperatura ambiente entre 15°C- 30°C. Protegido de la humedad.

LEYENDA DE PROTECCIÓN

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. Venta bajo receta médica.

FABRICANTE

Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.A. Santo Domingo República Dominicana.

