



# CIRCULAM®

Diosmina / Hesperidina

Vía oral

FÓRMULA	CIRCULAM® Comprimido recubierto
Diosmina + Hesperidina Equivalente a Diosmina 450 mg + Hesperidina 50 mg	500 mg
Excipientes C.S.P	1 Comp.

## DESCRIPCIÓN

Es un medicamento flebotrófico semisintético, compuesto por Diosmina y Hesperidina, ésta última miembro de la familia de los flavonoides, utilizado en el tratamiento de las enfermedades venosas, es decir, la insuficiencia venosa crónica y la enfermedad hemorroidal.

## INDICACIONES

**CIRCULAM®** está indicado para las várices. Síndrome varicoso e insuficiencia venosa. Flebalgias. Pesantez en las piernas. Edemas por estasis de piernas. Secuelas postflebíticas. Estados preulcerosos. Hemorroides. Hemorragias por fragilidad capilar.

## POSOLOGÍA

**Varices y hemorroides:** se recomienda tomar 2 comprimidos recubiertos juntos, al día durante varias semanas o meses, por su buena tolerabilidad según el caso y el criterio del médico tratante.

**Crisis hemorroidal:** se recomienda iniciar la primera semana con la dosis de ataque de 6 comprimidos recubiertos diario los primeros cuatro días y continuar con 4 comprimidos recubiertos diarios los siguientes tres días. La dosis de sostén será de 2 comprimidos recubiertos diarios durante el tiempo que se juzgue necesario.

## CONTRAINDICACIONES

**CIRCULAM®** está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a los componentes del producto. Primer trimestre del embarazo. Se recomienda suspender la lactancia durante el tratamiento.

## EFFECTOS ADVERSOS

Aun cuando la tolerabilidad es buena, en personas sensibles se ha reportado un índice muy bajo de molestias gastrointestinales ocasionales (menos del 2%) tales como náusea o malestar gastrointestinal que desaparecen al discontinuarse el tratamiento. A su vez se han reportado: dispepsia, prurito, urticaria, erupciones hasta anafilaxis, gastritis, cefalea, malestar general y vértigo.

## INTERACCIONES

Diosmina/Hesperidina no se debe administrar simultáneamente con antiácidos o alimentos altamente alcalinos, ya que puede disminuir la absorción. Con excepción de los antiácidos, la Diosmina/Hesperidina se puede administrar concomitantemente con cualquier otra medicación.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia: Por los estudios que se han realizado y por el buen coeficiente de seguridad de Diosmina/Hesperidina, puede utilizarse para tratar la insuficiencia venosa de la embarazada, sin riesgo para la paciente y/o el producto.

Alteraciones en los resultados de pruebas de laboratorio: No modifica los resultados de los exámenes de laboratorio, excepto algunos casos en los cuales han disminuido las cifras de ácido úrico elevadas, lo que se atribuye a una acción uricosúrica de la diosmina, redundando en beneficio para los pacientes.

## MEDIDAS ADOPTADAS EN CASO DE INTOXICACIÓN

En caso de intoxicación acudir al centro médico más cercano.

Hasta la fecha no existen reportes de accidentes por sobredosificación con Diosmina/Hesperidina En el remoto caso de intoxicación por sobredosificación deberá instituirse el tratamiento sintomático, vigilar y dar apoyo a los signos vitales.

**PRESENTACIÓN**

**CIRCULAM®:** se presenta en cajas conteniendo 30 y 60 comprimidos recubiertos.

**CONSERVACIÓN**

Protéjase de la luz. Conservar a temperatura ambiente entre 15°C- 30°C. Protegido de la humedad.

**LEYENDA DE PROTECCIÓN**

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. Venta bajo receta médica.

**FABRICADO POR**

Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.R.L. Santo Domingo República Dominicana.

