



BISMUSYL®

Subcitrato de Bismuto

Vía oral

FORMULA	BISMUSYL® Suspensión
Subcitrato de Bismuto	120 mg
Vehículo C.S.P	5 mL

DESCRIPCIÓN

El subcitrato de bismuto actúa fijándose al lecho ulcerado formando una barrera protectora.

Además posee una cierta acción directa sobre *Helicobacter pylori*. Tapiza la mucosa digestiva, protegiéndola de la acción corrosiva del jugo gástrico en las áreas dañadas.

INDICACIONES

BISMUSYL® es un auxiliar en el tratamiento de la úlcera péptica gástrica o duodenal. Coadyuvante en el tratamiento de la erradicación del *Helicobacter pylori*. Algunos estudios lo señalan tan efectivo como la ranitidina y la cimetidina en contrarrestar la acidez: náusea, vómito, la flatulencia y la sensación de plenitud en los pacientes con dispepsia crónica.

POSOLOGÍA

1 Cucharadita (5 ml) de **BISMUSYL®** 4 veces al día (1 cada 6 horas) ó 2 cucharaditas antes del desayuno y 2 cucharaditas antes de acostarse (distanciar las dosis 12 horas entre una y otra toma).

CONTRAINDICACIONES

No debe emplearse en personas con sensibilidad conocida a las sales de bismuto, durante el embarazo, en la lactancia e insuficiencia renal.

EFFECTOS ADVERSOS

Las sales de bismuto confieren a las heces una coloración negruzca que pueden simular sangrado del tubo digestivo. Algunas personas pueden presentar diarrea sobre todo en tratamiento crónico ocasionalmente se han presentado náuseas y vómito.

INTERACCIONES

El subcitrato de bismuto puede emplearse en asociación con otros antimicrobianos como amoxicilina y/o metronidazol para erradicación del *Helicobacter pylori*. Los antiácidos y la leche pueden interferir con el modo de acción del subcitrato de bismuto, por lo que deberán administrarse 30 minutos antes o después de la toma. Puede inhibirse parcialmente la absorción de hierro y sus sales. También la absorción de tetraciclina y sus sales puede alterarse si se administra conjuntamente con el subcitrato de bismuto.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No se ha reportado ninguna relación entre la ingestión del subcitrato de bismuto y efectos carcinogénicos o mutagénicos. Sin embargo, su uso deberá ser controlado por el médico durante el embarazo.

MEDIDAS ADOPTADAS EN CASO DE INTOXICACIÓN

En caso de intoxicación acudir al centro médico más cercano.

BISMUSYL® puede ocasionar diarreas, vómito, náuseas, dolor abdominal, dolor de cabeza.

PRESENTACIONES

BISMUSYL®: se presenta en frascos de 12 y 6 oz.

CONSERVACIÓN

Protéjase de la luz. Conservar a temperatura ambiente entre 15°C- 30°C.

LEYENDA DE PROTECCIÓN

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. Venta bajo receta médica.

FABRICANTE

Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.R.L. Santo Domingo República Dominicana.

