

CEFIBIOTIC®

Cefixima

Vía oral

FÓRMULAS	CEFIBIOTIC® 100 Polvo para suspensión oral	CEFIBIOTIC® 200 Polvo para suspensión oral	CEFIBIOTIC® 400 Comprimido revestido
Cefixima Trihidrato equivalente a Cefixima	100 mg	200 mg	400 mg
Excipientes c.s.p	5 mL	5 mL	1 comp.

DESCRIPCIÓN

CEFIBIOTIC® es un antibiótico cefalosporínico de tercera generación. Su actividad es similar a la que presentan otras cefalosporinas de tercera generación que se administran por vía parenteral y con mayor actividad, cefalosporinas orales frente a microorganismos Gram (-). CEFIBIOTIC® tiene una efectividad mayor que otras cefalosporinas convencionales orales, sobre todo en casos de ciertas infecciones del tracto respiratorio, vías urinarias y vías biliares. Tiene actividad bactericida sobre microorganismos gram (+) y gram (-) productores o no de B-lactamasas como: haemophylus influenzae, moraxellia catarrhalis, estreptococos phioenes y estreptococos pneumoniae, escherichia coli, proteus mirabilis, citrobacter, enterobacter, proteus indol (+) indol (-), providencia y N. gonorrhoeae.

INDICACIONES

CEFIBIOTIC® está indicado para el tratamiento de procesos infecciosos causados por gérmenes sensibles a las cefalosporinas como: infecciones otorrinolaringológicas, infecciones de las vías respiratorias altas y bajas; otitis media, faringitis, sinusitis y amigdalitis, bronquitis aguda; episodios de exacerbación de bronquitis crónicas y neumonías; infecciones de las vías urinarias no complicadas, cistitis aguda, diarreas infecciosas; infecciones del tracto biliar y de primera elección en infecciones severas.

POSOLOGÍA

Comprimido

Adultos

La dosis recomendada en adultos es de 400 mg (1 comprimido de Cefixima 400 mg) al día como solo dosis oral. El medicamento debe tomarse siempre a la misma hora del día.

Pacientes con problemas renales

En pacientes con problemas renales puede ser necesario reducir la dosis de cefixima. Su médico calculará la dosis correcta para usted a partir de los resultados de los análisis de sangre o de orina con los que se mide la función renal.

Los datos disponibles sobre el uso de cefixima en niños y adolescentes con problemas renales son insuficientes. Por eso no se recomienda utilizar cefixima en estos pacientes.

Pacientes de edad avanzada

No es preciso cambiar la dosis para pacientes de edad avanzada, si el funcionamiento de los riñones es normal.

Adolescentes de 12 años de edad en adelante

Los adolescentes de 12 años de edad en adelante pueden recibir la misma dosis que los adultos.

Niños menores de 12 años de edad

La forma farmacéutica en comprimidos no es adecuada para niños menores de 12 años.

Polvo para suspensión oral

La dosis usual recomendada en niños es de: 0 a 11 años es de 8 mg/kg/día en una sola toma diaria. Por 6 días.

En adultos y niños mayores de 12 se recomienda una dosis diaria de 2 tomas de 10 mL de suspensión.

AGITAR ANTES DE USAR

PREPARACIÓN DE LA SUSPENSIÓN

Agregar agua hasta el nivel indicado en la etiqueta, tapar y agitar enérgicamente hasta obtener una suspensión homogénea.

Verificar que dicho nivel se mantenga, caso contrario completar nuevamente con agua. Una vez preparada la suspensión se conserva en lugar fresco y seco.

CONTRAINDICACIONES

No debe ser administrado en caso de hipersensibilidad a las cefalosporinas.

EFFECTOS ADVERSOS

Son en general leves y transitorias. En adultos por orden de frecuencia se pueden citar: diarreas, trastornos evacuatorios, cefaleas, náuseas, dolores abdominales, dispepsia, flatulencias, vómitos, rash cutáneo. En niños por orden de frecuencia: diarreas, trastornos evacuatorios, rash cutáneo, vómitos y dolor abdominal.

INTERACCIONES

La Cefixima se absorbe independientemente de pH gástrico y su biodisponibilidad no se modifica por la presencia simultánea de alimentos, fármacos antiseoretos H2 o antiácidos a base de hidróxido de aluminio, magnesio o bicarbonato. Al igual que otros antibióticos bactericidas no debe asociarse a bacteriostáticos por incompatibilidad en su mecanismo de acción.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Antes de ser administrada la cefixima se deberá previamente efectuar un test de hipersensibilidad a las cefalosporinas y a las penicilinas. **CEFIBIOTIC®** debe administrarse con cautela a pacientes penicilinos sensibles. Deben realizarse estudios de la funcionalidad renal cuando estos son indicados. Durante el curso del tratamiento pueden aparecer síntomas de colitis pseudomembranosas que obliguen a suspender el tratamiento.

MEDIDAS ADOPTADAS EN CASO DE INTOXICACIÓN

En caso de intoxicación acudir al centro médico más cercano.

La sobredosis puede producir Náuseas, vómitos y diarrea. Se indica lavaje de estómago y las medidas utilizadas en estos casos.

PRESENTACIONES

CEFIBIOTIC® 100: se presenta en cajas conteniendo frascos con polvo para reconstituir 50 mL y 100 mL de suspensión oral

CEFIBIOTIC® 200: se presenta en caja conteniendo un frasco con polvo para reconstituir 50 mL de suspensión oral

CEFIBIOTIC® 400: se presenta en caja conteniendo 10 comprimidos revestidos.

CONSERVACIÓN

Comprimidos revestidos: Conservar a temperatura ambiente entre 15°C a 30°C.

Polvo para suspensión oral: Conservar a temperatura ambiente entre 15°C a 30°C. Una vez reconstituida la suspensión el tiempo de validez es de 7 días, almacenar en un lugar refrigerado entre 2° C y 8° C.

LEYENDA DE PROTECCIÓN

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. Venta bajo receta médica.

FABRICANTE:

Laboratorios Guayaki S.A. División IMEG, Asunción-Paraguay.

TITULAR / REPRESENTANTE:

Laboratorios de Aplicaciones Médicas S.A. Santo Domingo República Dominicana.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

LAMCO, S.R.L. Santo Domingo República Dominicana.