

LACTULAX®

Lactulosa

Vía oral

FORMULA	LACTULAX® Jarabe
Lactulosa	3.33 mg
Vehículo C.S.P	5 mL

DESCRIPCIÓN

LACTULAX® contiene en su formulación Lactulosa que es un disacárido semi sintético que

no sufre degradación enzimática en el tracto digestivo, por carecer este último de disacaridasas (lactulasa). Las acciones de la Lactulosa se manifiestan de dos maneras: Efecto laxante: producto del efecto osmótico directo en el intestino superior. Al no ser absorbido en el intestino superior llega al íleon y colon donde sufre una metabolización bacteriana, formándose lactato y otros ácidos orgánicos que son parcialmente absorbidos. Además, la reducción concomitante del pH luminal incrementaría la motilidad y secreción intestinal. Efecto antihiperamoniémico: lactulosa al ser metabolizada por las bacterias intestinales, se forman ácidos orgánicos en el tracto intestinal inferior, lo que determina una acidificación del contenido intestinal. Esta acidificación lleva a la mayor formación de ion amonio que es poco difusible, a partir del amoniaco. Todo esto ocasiona una mayor excreción del ion amonio y una disminución de amoniaco fecal y sanguíneo.

INDICACIONES

LACTULAX® está indicado en el tratamiento de la constipación intestinal crónica, ya que gracias a su mecanismo de acción se logra un aumento en el peristaltismo colónico y reblandecimiento (rehidratación) de las heces.

Encefalopatía hepática o portosistémica.

POSOLOGÍA

La dosis en niños es: Menores de 1 año: 5 ml al día. De 1 a 5 años: 10 ml al día. De 6 a 12 años: 20 ml al día.

La dosis usual en el adulto: Es de 15 ml a 30 ml de LACTULAX® por vía oral diariamente. La dosis puede ser aumentada a 60 ml al día si es necesario. Se requieren de 24 a 48 horas para producir el efecto deseado.

Algunos pacientes han encontrado que la administración de LACTULAX® junto con jugo, agua o leche es mejor aceptada.

Prevención y tratamiento de la encefalopatía hepática o portosistémica:

Adultos: 90 a 180 ml (inicialmente puede administrarse de 30 a 45 ml cada 1 o 2 horas hasta producir el efecto deseado, posteriormente ajustar a dosis recomendadas).

Niños y adolescentes: 40 a 90 ml.

Lactantes: 2.5 a 10 ml divididos en 3 o 4 veces al día.

CONTRAINDICACIONES

Ya que LACTULAX® contiene galactosa está contraindicado su uso en pacientes que requieren de una dieta baja en galactosa, hipersensibilidad. Síndrome de abdomen agudo y oclusión intestinal.

EFFECTOS ADVERSOS

Se puede presentar flatulencia y cólicos intestinales al inicio del tratamiento con características transitorias. Cuando la dosis es excesiva, puede producirse diarrea que potencialmente pudiera condicionar pérdida considerable de líquidos con la consecuente hipocalcemia e hiponatremia. Otros efectos como náuseas y vómito, se han reportado aisladamente.

INTERACCIONES

Resultados de estudios preliminares en humanos y ratas sugieren que los antiácidos no absorbibles administrados conjuntamente con LACTULAX® pueden inhibir el efecto deseado sobre el pH colónico.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No deben usarse laxantes en presencia de dolor abdominal, náuseas y vómitos. Si la constipación persiste, reiterar la consulta con el médico. Debido al hecho de que la lactulosa es un disacárido no absorbible, su administración a las dosis recomendadas para la constipación no está contraindicada en el embarazo, la diabetes y los niños. Las altas dosis requeridas para el tratamiento de la encefalopatía tampoco hallan mayores contraindicaciones, debido a la muy limitada absorción de los azúcares constituyentes. Es

aconsejable una dosificación cautelosa en los síndromes gastro-cardíacos, donde se recomienda comenzar con dosis bajas e ir aumentándolas gradualmente, para evitar un meteorismo excesivo.

MEDIDAS ADOPTADAS EN CASO DE INTOXICACIÓN

En caso de intoxicación acudir al centro médico más cercano.

Dosis excesivas pueden producir diarrea con las siguientes potenciales complicaciones: deshidratación, hipokalemia, hipernatremia. Se deberá suspender la administración de Lactulosa, instaurar un tratamiento sintomático, y vigilar el estado de hidratación del paciente.

PRESENTACIONES

LACTULAX®: se presenta en frascos de 12 y 6 Oz.

CONSERVACIÓN

Protéjase de la luz. Conservar a temperatura ambiente entre 15 °C- 30 °C.

LEYENDA DE PROTECCIÓN

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. Venta bajo receta médica.

FABRICANTE

Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.R.L. Santo Domingo República Dominicana.