

LAMIGRAX® PLUS

Paracetamol / Ergotamina Tartrato / Cafeína

Vía oral

FÓRMULA	LAMIGRAX® PLUS Comprimido
Paracetamol	500 mg
Ergotamina Tartrato	1 mg
Cafeína	40 mg
Excipientes c.s.p	1 Comprimido

DESCRIPCIÓN

LAMIGRAX® PLUS Es un potente analgésico de notable actividad en los diferentes tipos de cefaleas, debido a la complementación de las acciones farmacológicas de sus componentes que controlan con efectividad estos frecuentes y desagradables cuadros dolorosos. Las jaquecas, las cefaleas de origen vascular, las cefaleas de origen inespecífico, son calmadas por este medicamento con rapidez y efectividad debido a la potente acción analgésica del Paracetamol; al efecto vasoactivo regulador que posee la Ergotamina sobre los fenómenos vasculares cerebrales desencadenantes del cuadro y a la acción de la Cafeína como sinergizante de la acción de Ergotamina y potenciadora de la acción analgésica del Paracetamol.

INDICACIONES

LAMIGRAX® PLUS ataques de migraña. Cefaleas vasculares y jaquecas.

POSOLOGÍA

En casos severos: 2 comprimidos en forma inicial y luego 1 comprimido cada 4 a 6 horas, no excediendo de 6 comprimidos en 24 horas.

En casos leves a moderados: 1 a 2 comprimidos en forma inicial y luego cada 4 a 6 horas, según necesidad.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a los componentes del producto o a otros antiinflamatorios no esteroideos. Por su contenido de ergotamina, el producto no debe usarse en pacientes con enfermedad vascular oclusiva, hipertensión o embarazo. El uso de ergotamina con inhibidores potentes de las enzimas microsomaes CYP 3A4 (inhibidores de proteasas, macrólidos y antifúngicos) está contraindicado por el riesgo de interacciones serias y fatalidades secundarias a isquemia.

EFFECTOS ADVERSOS

Las reacciones adversas más frecuentes son: Gastrointestinales: náusea, ardor epigástrico, flatulencia y síndrome dispéptico. Entre los raramente observados se citan: trombocitopenia, erupción cutánea, cefalea, trastornos de la visión, retención de fluidos y edema. La Ergotamina a las dosis habituales se considera un medicamento seguro; en casos infrecuentes se ha reportado náusea, vómito, diarrea, debilidad, mialgias, parestesias, taquicardia y dolor precordial.

INTERACCIONES

Riesgo de vasoconstricción e isquemia con: otros preparados con Ergotamina, triptanes, inhibidores de proteasa o transcriptasa inversa, macrólidos, sibutramina; asociación contraindicada.

Precaución con: β - bloqueantes, dopamina, cloranfenicol.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Debido a su permanencia sistémica prolongada, la cafeína no debe utilizarse para el tratamiento abortivo de la migraña por más de dos días a la semana. Con un uso más frecuente, la cafeína puede acumularse y producir una cefalea de rebote después de su retirada. La administración prolongada o las dosis excesivas de ergotamina pueden causar ergotismo, dependencia, cefalea de rebote o trastornos vasculares por vasoconstricción.

Embarazo: el producto está contraindicado. Lactancia: no se recomienda su uso en las madres lactantes.

MEDIDAS ADOPTADAS EN CASO DE INTOXICACIÓN

En caso de intoxicación acudir al centro médico más cercano.

Entre los síntomas por sobredosificación se destacan: anorexia, diaforesis, náuseas, vómitos, diarrea, sed extrema, frío, hormigueo y prurito, pulso débil y rápido, hipotensión, shock, confusión, convulsiones e inconsciencia. Otros síntomas de vasoconstricción periférica o de trastornos cardiovasculares, pueden aparecer posteriormente. Acuda al médico de inmediato.

PRESENTACIONES

LAMIGRAX® PLUS: se presenta en cajas conteniendo 12 y 100 comprimidos.

CONSERVACIÓN: Protéjase de la luz. Conservar a temperatura ambiente entre 15 °C- 30 °C. Protegido de la humedad.

LEYENDA DE PROTECCIÓN

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. Venta libre sin receta médica.

FABRICANTE

Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.A., Santo Domingo, República Dominicana.