

BUSCALON®

Propinoxato HCl
Vía oral



FÓRMULAS

	BUSCALON® Solución gotas orales	BUSCALON® Solución gotas orales
Propinoxato HCl	5 mg	10 mg
Vehículo C.S.P.	1 mL	1 mL

DESCRIPCIÓN:

El propinoxato es un espasmolítico musculotrópico cuyo principal efecto es una potente relajación directa inespecífica del músculo liso, sobre todo en úlceras huecas como estómago, intestino, uretra, etc., reduciendo su tono y motilidad. En forma secundaria, esta droga actúa en el nivel nervioso (acción neurotrópica), ocasionando así una disminución de la incidencia de efectos adversos.

INDICACIONES:

Buscalon® contiene Propinoxato, un antiespasmódico que está indicado en el tratamiento de todo proceso espasmódico, incluyendo aquellos de origen tracto bilio-digestivo (cólicos renales, cólicos, dismenorrea, contracciones uterinas).

POSOLOGÍA:

Salvo otra indicación del médico tratante, las dosis recomendadas son:

Lactantes y niños hasta 2 años de edad: 2 a 4 gotas, 3 a 5 veces al día. Puede incorporarse al biberón o al agua.

Niños hasta 12 años: 2 gotas por año de edad, 3 o 5 veces al día.

Adultos y niños mayores de 12 años de edad: 20 a 40 gotas, 3 o 5 veces al día

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad conocida al propinoxato, glaucoma, miastenia gravis, retención urinaria, hipertrofia prostática, estenosis pilórica orgánica y lactancia. **Buscalon®** no debe emplearse en pacientes con

antecedente de reacciones alérgicas al ácido acetil salicílico u otros AINEs, úlceras gastroduodenal activo o hemorragia digestiva en curso, hernia discal o reflujo gástrico-ófágico, insuficiencia renal severa, insuficiencia hepática, estenosis pilórica orgánica, atonía intestinal, ileo paralítico, colitis ulcerosa, miastenia grave, glaucoma o hipertrofia prostática sintomática.

EFEKTOS ADVERSOS:

Los efectos secundarios más frecuentemente observados incluyen sequedad de boca, garganta, taquicardia, dificultad para orinar, constipación, modificables mediante un ajuste posológico.

INTERACCIONES:

Los antihistamínicos, fenotiazinas, antidepresivos tricíclicos, quinidina, y procainamida potencian los efectos tóxicos de los anticolinérgicos. El empleo concomitante con analgésicos opioides puede inducir un incremento del riesgo de constipación severa.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Debido a la posibilidad de efectos anticolinérgicos, especialmente en pacientes sensibles o cuando se usan dosis elevadas, debe emplearse con precaución en pacientes con predisposición a la obstrucción intestinal o urinaria. Los estudios realizados sobre toxicidad especial no han evidenciado para propinoxato potencial teratogénico, mutagénico ni actividad carcinogénica. Se recomienda evitar el uso de propinoxato durante el embarazo, especialmente durante el primer trimestre, excepto cuando el beneficio potencial para la madre supera los riesgos potenciales para el feto. Puesto que el propinoxato se excreta por leche materna, se recomienda no administrar durante la lactancia. En caso de considerarse esencial para la madre debe tenerse en cuenta la posibilidad de interrumpir la lactancia. Puesto que no se dispone de estudios sobre la seguridad de propinoxato en gotas en recién nacidos prematuros, su uso está contraindicado en ellos. Con respecto al uso de propinoxato en pacientes ancianos, se recomienda administrar con precaución dado que podrían precipitar un glaucoma no diagnosticado.

MEDIDAS ADOPTADAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:

En caso de intoxicación acudir al centro médico más cercano.

Hasta el momento, no se conocen las manifestaciones clínicas de la sobredosis de propinoxato. En caso de ocurrir sobredosis, el tratamiento a seguir incluye lavado gástrico, administración de carbón activado, control clínico del paciente y tratamiento de los posibles síntomas anticolinérgicos

PRESENTACIONES:

BUSCALON® solución gotas orales (5 mg/1 mL): se presenta en caja conteniendo frasco de 30 mL.

BUSCALON® solución gotas orales (10 mg/1 mL): se presenta en caja conteniendo frasco de 20 mL.

CONSERVACIÓN:

Protéjase de la luz. Conservar a temperatura ambiente entre 15°C-30°C.

LEYENDA DE PROTECCIÓN:

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. Venta bajo receta médica. Agitar antes de usar



Fabricado por:

Grob Pharma Corp., Santo Domingo, Rep. Dom.
Para: **LAM, S.A.**, Santo Domingo, Rep. Dom.

