

COLCHICINA LAM®

Colchicina

Vía oral



FÓRMULAS

	COLCHICINA LAM® 0.5 mg Comprimido	COLCHICINA LAM® 1 mg Comprimido
Colchicina	0.5 mg	1 mg
Excipientes c.s.p.	1 Comp.	1 Comp.

DESCRIPCIÓN:

Colchicina Lam® es un preparado en forma de comprimido; un alcaloide natural empleado de manera sintomática con efectos muy mínimos, en males causados por las proteinuria. Tiene un efecto antiinflamatorio selectivo en artritis gotosa aguda. La acción básica de este agente es inhibir la migración de los granulocitos hacia el área inflamada, rompiendo el ciclo que conlleva una respuesta inflamatoria. Otra propiedad importante es que mejora la función hepática de los pacientes cirróticos, al modificar la fibrosis inhibiendo los fibroblastos que producen el colágeno de tipo I y tipo III (los encargados de producir la fibrosis en la cirrosis hepática). Al ser éste un agente antimicrotubular y producto de colagenasa inhibe el transporte y la síntesis de colágeno.

INDICACIONES:

Tratamiento de la artritis gotosa crónica. Profilaxis y tratamiento de la artritis gotosa aguda. Profilaxis y tratamiento de la fiebre mediterránea familiar. Profilaxis y tratamiento de la enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio. Tratamiento de la artritis sarcoide. La Colchicina es usada para aliviar los síntomas artíticos agudos asociado con sarcoidosis. Tratamiento de la amiloidosis. Tratamiento del síndrome de Bencets, Tratamiento de la cirrosis biliar.

POSOLOGÍA:

Las dosis usuales oscilan entre 0.5 + 1.5 mg de Colchicina con intervalos de 1 a 2 horas hasta la desaparición del dolor o manifestaciones gastrointestinales.

CONTRAINDICACIONES:

La Colchicina tiene riesgo de inducir al daño de los tejidos gastrointestinales, puede ser incrementado, también toxicidad gastrointestinal que causa la colchicina, puede ser particularmente peligroso en los pacientes con estas condiciones. Historia de sensibilidad a la Colchicina, insuficiencia hepática y/o renal, embarazo y lactancia.

EFEKTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos ocurren en el tracto gastrointestinal: vómitos, diarreas, náuseas, dolores abdominales y prurito cutáneo. En pacientes con sobredosis y toxicidad crónica se ha observado trombocitopenia, anemia aplásica, acidosis metabólica, deshidratación, hipotensión, alopecia, neuritis periférica y miopatías.

INTERACCIONES:

Alcohol: El uso concurrente con Colchicina aumenta el riesgo de toxicidad gastrointestinal especialmente en alcoholícos; también el alcohol aumenta las concentraciones de ácido úrico en la sangre y puede disminuir la terapia profiláctica de la gota. Bumetamicida, diásido, diuréticos, tiazidas, furosemida y pirazinamida pueden aumentar las concentraciones séricas del ácido úrico y disminuir la eficacia de la terapia profiláctica de la gota.

Vitamina B12: La absorción de esta vitamina puede ser impidiada por la administración crónica o de altas dosis de colchicina; el requerimiento puede ser aumentado.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Colchicina Lam® no debe administrarse en pacientes debilitados por padecimientos cardíacos, renales o gastrointestinales, ni en pacientes de edad avanzada.

MEDIDAS ADOPTADAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:

En caso de intoxicación acudir al centro médico más cercano. Para signos tempranos de sobredosis: Discontinúe la administración de Colchicina Lam®. Administre un opioide antidiarreico. Administre morfina o atropina para dolor abdominal.

Para sobredosis severas: Remueva el medicamento no absorbido (si se toma oralmente) efectuando un lavado gástrico. Manténgase en constante revisión el status hemodinámica, cardiaco y respiratorio, así como los electrolitos en la sangre. Evite la deshidratación y medidas generales para prevenir el estado de shock.

PRESENTACIONES:

Colchicina Lam® 0.5 mg: se presenta en cajas conteniendo 50 y 100 comprimidos.

Colchicina Lam® 1 mg: se presenta en caja conteniendo 50 comprimidos.

CONSERVACIÓN:

Protéjase de la luz. Conservar a temperatura ambiente entre 15°C-30°C. Protegido de la humedad.

LEYENDA DE PROTECCIÓN:

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. Venta bajo receta médica.



Fabricado por:

Grob Pharma Corp., Santo Domingo, Rep. Dom.
Para: LAM, S.A., Santo Domingo, Rep. Dom.

