

# Enalapril Lam®

Maleato de Enalapril  
Vía oral



## FÓRMULAS

	ENALAPRIL LAM® 10 mg Comprimido	ENALAPRIL LAM® 20 mg Comprimido
Maleato de Enalapril	10 mg	20 mg
Excipientes c.s.p	1 Comp.	1 Comp.

## DESCRIPCIÓN

**ENALAPRIL LAM®** contiene Maleato de enalapril el cual es un inhibidor del ECA da lugar a concentraciones reducidas de angiotensina II, que conduce a disminución de la actividad vasopresora y secreción reducida de aldosterona.

## INDICACIONES

**ENALAPRIL LAM®** está indicado en la mayoría de Hipertensión arterial en todos sus grados. Hipertensión renovascular. Insuficiencia cardíaca sintomática ya que mejora la supervivencia, retrasa la progresión de la insuficiencia cardíaca y disminuye el número de hospitalizaciones.

## POSOLOGÍA

**ENALAPRIL LAM®** en Hipertensión arterial: inicial: 5-20 mg/día; con sistema renina-angiotensina-aldosterona muy activo: 5 mg o menos. Mantenimiento: 20 mg/día; máx. 40 mg/día. Insuficiencia Cardiaca sintomática y prevención de la misma con disfunción ventricular izquierda. Asintomática (fracción de eyección  $\leq 35\%$ ): se usa con diuréticos y si es apropiado con digitálicos o  $\beta$ -bloqueante. Inicial: 2,5 mg, aumentar gradualmente (2 a 4 sem) hasta mantenimiento: 20 mg, en 1 ó 2 tomas; máx. 40 mg/día en 2 tomas. I.R.  $30 < \text{Clcr} < 80 \text{ ml/min}$ : 5-10 mg/día;  $10 < \text{Clcr} \leq 30 \text{ ml/min}$ : 2,5 mg/día;  $\text{Clcr} \leq 10 \text{ ml/min}$ : 2,5 mg en los días de diálisis.

## CONTRAINDICACIONES

**ENALAPRIL LAM®** está contraindicado en pacientes con

hipersensibilidad a enalapril o a otro IECA, antecedentes de angioedema asociado a tratamiento. Previo con IECA, angioedema hereditario o idiopático, 2<sup>do</sup> y 3<sup>er</sup> trimestre del embarazo. Casos de estenosis renal bilateral, estenosis de arteria renal de riñón único, insuficiencia renal grave y en hipotensión arterial sistémica.

## EFEKTOS ADVERSOS

En general, **ENALAPRIL LAM®** es bien tolerado, las reacciones adversas como la tos irritativa se producen por lo regular en los primeros días de tratamiento y no suelen ser suficientemente graves como para necesitar la interrupción del medicamento.

## INTERACCIONES

**ENALAPRIL LAM®** y el uso de suplementos de potasio, diuréticos ahorradores de potasio como la amilorida, el triamtereno y la espironolactona, pueden aumentar considerablemente el potasio sérico, en particular en pacientes con deterioro de la función renal. La administración de **ENALAPRIL LAM®** junto con un diurético tiazídico puede evitar una pérdida excesiva de potasio y prevenir así una hiperpotasemia inducida por los diuréticos.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

**ENALAPRIL LAM®** ancianos; insuficiencia renal (ajustar dosis); insuficiencia hepática; cardiopatía isquémica o enfermedades cerebrovascular; estenosis de la válvula aórtica o mitral; miocardiopatía hipertrófica; estenosis bilateral de las arterias renales o estenosis de la arteria renal de un único riñón funcional aumenta el riesgo de hipotensión e I.R.; enfermedad del colágeno vascular; tratamiento con inmunosupresores.

## MEDIDAS ADOPTADAS EN CASO DE INTOXICACIÓN

En caso de intoxicación acudir al centro médico más cercano. Cuando existe una sobredosificación por error o accidental, puede presentarse hipotensión y colapso circulatorio en los casos graves. El tratamiento irá encaminado a recuperar la presión arterial normal.

## PRESENTACIONES

**ENALAPRIL LAM®** 10 mg: se presenta en cajas conteniendo 30 y 100 comprimidos.

**ENALAPRIL LAM®** 20 mg: se presenta en cajas conteniendo 30 y 100 comprimidos.

## CONSERVACIÓN

Protéjase de la luz. Conservar a temperatura ambiente entre 15 C° - 30 C°. Protegido de la humedad.

## LEYENDA DE PROTECCIÓN

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. Venta bajo receta médica.



Fabricado por:

Grob Pharma Corp., Santo Domingo, Rep. Dom.  
Para: LAM, S.A., Santo Domingo, Rep. Dom.

