



Lactasa

Vía oral

FÓRMULA

	Enzylac® Comprimido
Lactasa	9000 FCC
Excipientes	1 Comp.

DESCRIPCIÓN:

La lactasa es una enzima digestiva necesaria para romper la lactosa (el azúcar de la leche). La lactasa debería ser sintetizada por el organismo en el intestino delgado. Sin embargo, si esta enzima no se produce o se produce en poca cantidad, la lactosa sin digerir pasa al colon donde se fermenta y se produce hidrógeno, dióxido de carbono y ácidos orgánicos, provocando retortijones, gases y diarrea.

La intolerancia a la lactosa no es un problema grave, pero sí puede provocar a los afectados incómodas molestias, y aunque eliminar los productos a base de leche es una solución, esto puede resultar muy poco práctico, además de implicar una dieta muy restrictiva.

INDICACIONES:

Enzylac® está indicada en intolerancia a la lactosa manifestada por malestares gastrointestinales como dolor abdominal, calambres, hinchazón, flatulencia y/o diarrea, después de la ingestión de productos lácteos o de otros productos que contienen lactosa.

POSOLOGÍA:

Tomar 1 comprimido al comienzo de cada comida que contiene productos lácteos. Siga las instrucciones del envase etiquetado o tomar las indicaciones de su profesional de la salud.

No tome este medicamento con más frecuencia que la indicada. Ingiera lactasa con el primer bocado o al beber productos lácteos. Si siguen consumiendo alimentos que contengan productos lácteos después de 20 a 45 minutos, tome otro comprimido. Si olvida una dosis de lactasa, tómelo tan pronto como sea posible.



CONTRAINDICACIONES:

ENZYLAC® está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad conocida a cualquiera de sus componentes. Su uso no es recomendable para consumo por menores de 8 años, embarazadas y mujeres en período de lactancia, salvo indicación profesional competente y no reemplaza una alimentación balanceada.

EFEKTOS ADVERSOS:

Los efectos secundarios que debe informar a su médico o profesional de la salud tan pronto como sea posible: reacciones alérgicas como erupción cutánea, picor o urticaria, hinchazón de la cara, labios, lengua o problemas respiratorios.

INTERACCIONES:

El uso con prebióticos o yogur aumenta el efecto de la lactasa, al reducir el nivel de lactosa a hidrolizar.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Debe administrarse con precaución a pacientes con antecedentes de urticaria, asma bronquial, hipersensibilidad a otras drogas o alergias alimenticias.

Ante cualquier síntoma inusual o que parezca no relacionado con la condición por la cual se utiliza este producto, consultar al médico antes de repetir la administración del mismo. En caso de diabetes debe tenerse presente que el uso de este medicamento hace que la lactosa esté metabólicamente disponible como glucosa y galactosa. En caso de presentarse algún efecto adverso, disminuir la dosis o interrumpir la administración del medicamento. Como el grado de deficiencia enzimática varía de persona a persona y de un alimento a otro, puede ocurrir que al principio no produzca el efecto deseado. En este caso deberá ajustarse el número de comprimidos a administrar hasta lograr el bienestar buscado. No ingerir más de 2 comprimidos por vez.

MEDIDAS ADOPTADAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:

En caso de intoxicación acudir al centro médico más cercano.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, consulte con el médico o acuda de inmediato al hospital más cercano.

PRESENTACIONES:

Enzylac®: se presenta en cajas conteniendo 10, 60 y 120 comprimidos.

CONSERVACIÓN:

Protejase de la luz. Conservar a temperatura ambiente entre 15°C-30°C. Proteger de la humedad.

LEYENDA DE PROTECCIÓN:

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. Venta bajo receta médica.



Fabricado por: **Grob Pharma Corp.**, Santo Domingo, Rep. Dom.
Para: **LAM, S.A.**, Santo Domingo, Rep. Dom.

