



Paracetamol /  
Ergotamina Tartrato / Cafeína  
Vía oral

## FÓRMULA

	Lamigrax® Plus Comprimido
Paracetamol	500 mg
Ergotamina Tartrato	1 mg
Cafeína	40 mg
Excipientes c.s.p	1 Comprimido

## DESCRIPCIÓN:

**Lamigrax® Plus** Es un potente analgésico de notable actividad en los diferentes tipos de cefaleas, debido a la complementación de las acciones farmacológicas de sus componentes que controlan con efectividad estos frecuentes y desagradables cuadros dolorosos. Las jaquecas, las cefaleas de origen vascular, las cefaleas de origen inespecífico, son calmadas por este medicamento con rapidez y efectividad debido a la potente acción analgésica del Paracetamol; al efecto vasoactivo regulador que posee la Ergotamina sobre los fenómenos vasculares cerebrales desencadenantes del cuadro y a la acción de la Cafeína como sinergizante de la acción de Ergotamina y potenciadora de la acción analgésica del Paracetamol.

## INDICACIONES:

**Lamigrax® Plus** ataques de migraña. Cefaleas vasculares y jaquecas.

## POSOLOGÍA:

En casos severos: 2 comprimidos en forma inicial y luego 1 comprimido cada 4 a 6 horas, no excediendo de 6 comprimidos en 24 horas.

En casos leves a moderados: 1 a 2 comprimidos en forma inicial y luego cada 4 a 6 horas, según necesidad.



## CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a los componentes del producto o a otros antiinflamatorios no esteroidales. Por su contenido de ergotamina, el producto no debe usarse en pacientes con enfermedad vascular oclusiva, hipertensión o embarazo. El uso de ergotamina con inhibidores potentes de las enzimas microsómicas CYP 3A4 (inhibidores de proteasas, macrólidos y antifúngicos) está contraindicado por el riesgo de interacciones serias y fatalidades secundarias a isquemia.

## EFEKTOS ADVERSOS:

Las reacciones adversas más frecuentes son: Gastrointestinales: náusea, ardor epigástrico, flatulencia y síndrome dispéptico. Entre los raramente observados se citan: trombocitopenia, erupción cutánea, cefalea, trastornos de la visión, retención de fluidos y edema. La Ergotamina a las dosis habituales se considera un medicamento seguro; en casos infrecuentes se ha reportado náusea, vómito, diarrea, debilidad, mialgias, parestesias, taquicardia y dolor precordial.

## INTERACCIONES:

Riesgo de vasoconstricción e isquemia con: otros preparados con Ergotamina, triptanes, inhibidores de proteasa o transcriptasa inversa, macrólidos, sibutramina; asociación contraindicada.

Precaución con:  $\beta$ - bloqueantes, dopamina, cloranfenicol.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Debido a su permanencia sistémica prolongada, la cafeína no debe utilizarse para el tratamiento abortivo de la migraña por más de dos días a la semana. Con un uso más frecuente, la cafeína puede acumularse y producir una cefalea de rebote después de su retirada. La administración prolongada o las dosis excesivas de ergotamina pueden causar ergotismo, dependencia, cefalea de rebote o trastornos vasculares por vasoconstricción.

Embarazo: el producto está contraindicado. Lactancia: no se recomienda su uso en las madres lactantes.

## MEDIDAS ADOPTADAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:

En caso de intoxicación acudir al centro médico más cercano.

Entre los síntomas por sobredosificación se destacan: anorexia, diaforesis, náuseas, vómitos, diarrea, sed extrema, frío, hormigueo y

prurito, pulso débil y rápido, hipotensión, shock, confusión, convulsiones e inconsciencia. Otros síntomas de vasoconstricción periférica o de trastornos cardiovasculares, pueden aparecer posteriormente. Acuda al médico de inmediato.

## PRESENTACIONES:

**Lamigrax® Plus:** se presenta en cajas conteniendo 12 y 100 comprimidos.

**CONSERVACIÓN:** Protéjase de la luz. Conservar a temperatura ambiente entre 15°C-30°C. Protegido de la humedad.

## LEYENDA DE PROTECCIÓN:

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. Venta libre sin receta médica.



Fabricado por:

**Grob Pharma Corp.**, Santo Domingo, Rep. Dom.  
Para: **LAM, S.A.**, Santo Domingo, Rep. Dom.

