

MIRTAPIN®

Mirtazapina
Vía oral



FÓRMULA

MIRTAPIN® 30 Comprimido	
Mirtazapina	30 mg
Excipientes c.s.p.	1 comp.

DESCRIPCIÓN

La mirtazapina es un antagonista central a2 presináptico, que aumenta la neurotransmisión central noradrenérgica y serotoninérgica, esta última específicamente mediada por los receptores 5HT1. Los receptores 5HT2 y 5HT3 son bloqueados por la mirtazapina, evitando así los efectos serotoninérgicos indeseables. La actividad antagónica H1 de mirtazapina es responsable de sus propiedades sedantes. A dosis terapéuticas, no presenta actividad anticolinérgica y no tiene efectos sobre el sistema cardiovascular.

INDICACIONES

Está indicado para el tratamiento de depresión mayor.

POSOLOGÍA

Se recomienda administrar en dosis única, preferiblemente por la noche, antes de acostarse. En adultos la dosis efectiva de mirtazapina aprobada por la FDA es de 15 a 45 mg/día, es decir, un comprimido. En caso de no presentarse respuesta antidepresiva a esta dosis, es conveniente incrementárla a 45 mg y observar la respuesta semanalmente.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a la mirtazapina.

EFFECTOS ADVERSOS

Aumento de apetito y de peso; somnolencia, sedación (que puede afectar la concentración), generalmente transitoria, durante la primera semana de tratamiento, boca seca.

INTERACCIONES

La mirtazapina puede potenciar la acción depresiva sobre el sistema nervioso central del alcohol y benzodiazepinas. La mirtazapina no debe administrarse con inhibidores de la MAO o en las dos semanas posteriores a la finalización del tratamiento con estos agentes.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Possiblemente depresión de la medula ósea (granulocitopenia o agranulocitosis), después de 4 a 6 semanas de tratamiento, y en general es reversible una vez que este se suspende; presentada en raras ocasiones (Incidencia: 0.06%). El médico deberá vigilar la aparición de signos de infección; y deberá suspenderse el tratamiento y realizar un hemograma en caso de presentarse particular cuidado en pacientes con epilepsia, síndrome mental orgánico, insuficiencia hepática o renal, enfermedades cardiovasculares.

Embarazo y lactancia

No se estableció la seguridad del embarazo humano.

Efectos sobre la capacidad de conducir vehículos y uso de maquinarias

La mirtazapina puede reducir la concentración y el estado de alerta; se deben tomar precauciones al momento de realizar actividades que requieran de una buena concentración y estado de alerta, como es el caso de conducir un vehículo o manejar maquinaria.

MEDIDAS ADOPTADAS EN CASO DE INTOXICACIÓN

En caso de intoxicación acudir al centro médico más cercano.

Síntomas de carácter moderado, no induciendo ningún cambio significativo en los signos vitales o compromiso de la función respiratoria o cardiovascular. Se manifiesta con depresión del sistema nervioso: desorientación y sedación prolongada, junto con taquicardia o hipotensión moderada.

PRESENTACIÓN

MIRTAPIN® 30: se presenta en caja conteniendo 30 comprimidos.

CONSERVACIÓN

Protejase de la luz. Conservar a temperatura ambiente entre 15 °C - 30 °C, protegido de la humedad.

LEYENDA DE PROTECCIÓN

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. Venta bajo receta médica.

Fabricado por:
Grob Pharma Corp., Santo Domingo, Rep. Dom.
Para: LAM, S.A., Santo Domingo, Rep. Dom.

