

BISMUSYL®

Subcitrato de Bismuto
Vía oral

FÓRMULA	BISMUSYL® Suspensión
Subcitrato de Bismuto	120 mg
Vehículo c.s.p.	5 mL

DESCRIPCIÓN

El subcitrato de bismuto actúa fijándose al lecho ulcerado formando una barrera protectora. Además posee una cierta acción directa sobre Helicobacter pylori. Tapiza la mucosa digestiva, protegiéndola de la acción corrosiva del jugo gástrico en las áreas dañadas.

INDICACIONES

BISMUSYL® es un auxiliar en el tratamiento de la úlcera péptica gástrica o duodenal. Coadyuvante en el tratamiento de la erradicación del Helicobacter pylori. Algunos estudios lo señalan tan efectivo como la ranitidina y la cimetidina en contrarrestar la acidez: náusea, vómito, la flatulencia y la sensación de plenitud en los pacientes con dispepsia crónica.

POSOLOGÍA

1 cucharadita (5 ml) de **BISMUSYL®** 4 veces al día (1 cada 6 horas) ó 2 cucharaditas antes del desayuno y 2 cucharaditas antes de acostarse (distanciar las dosis 12 horas entre una y otra toma).

CONTRAINDICACIONES

No debe emplearse en personas con sensibilidad conocida a las sales de bismuto, durante el embarazo, en la lactancia e insuficiencia renal.



EFEKTOS ADVERSOS

Las sales de bismuto confieren a las heces una coloración negruzca que pueden simular sangrado del tubo digestivo. Algunas personas pueden presentar diarrea sobre todo en tratamiento crónico ocasionalmente se han presentado náuseas y vómito.

INTERACCIONES

El subcitrato de bismuto puede emplearse en asociación con otros antimicrobianos como amoxicilina y/o metronidazol para erradicación del Helicobacter pylori. Los antiácidos y la leche pueden interferir con el modo de acción del subcitrato de bismuto, por lo que deberán administrarse 30 minutos antes o después de la toma. Puede inhibirse parcialmente la absorción de hierro y sus sales. También la absorción de tetraciclina y sus sales puede alterarse si se administra conjuntamente con el subcitrato de bismuto.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No se ha reportado ninguna relación entre la ingestión del subcitrato de bismuto y efectos carcinogénicos o mutagénicos. Sin embargo, su uso deberá ser controlado por el médico durante el embarazo.

MEDIDAS ADOPTADAS EN CASO DE INTOXICACIÓN

En caso de intoxicación acudir al centro médico más cercano. **BISMUSYL®** puede ocasionar diarreas, vómito, náuseas, dolor abdominal, dolor de cabeza.

PRESENTACIONES

BISMUSYL®: se presenta en frascos de 12 y 6 oz.

CONSERVACIÓN

Protéjase de la luz. Conservar a temperatura ambiente entre 15 °C - 30 °C.

LEYENDA DE PROTECCIÓN

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. Venta bajo receta médica.

Fabricado por: **Grob Pharma Corp.**, Santo Domingo, Rep.Dom.
Para: **LAM, S.A.**, Santo Domingo, Rep. Dom.

