



Carbonato de Calcio
Vía oral

FÓRMULA	CARBO-C® 500 Capleta
Carbonato de Calcio	500 mg
Excipientes C.S.P	1 Capleta

DESCRIPCIÓN

El carbonato de calcio es un suplemento orgánico, factor mineral (calcio) que contiene un 40% de calcio (400 mg de ión/g; 10 mmol/g, 20 mEq/g). Es el principal componente de los huesos y juega un importante papel fisiológico en la actividad muscular y en la transmisión neuromuscular. También interviene en la función cardíaca y en la coagulación sanguínea.

INDICACIONES

CARBO-C® está indicado en el tratamiento de la hipocalcemia de origen diverso, así como en el tratamiento y profilaxis de la osteoporosis, en el embarazo como suplemento dietético y como factor de prevención de la preeclampsia. Para el rápido alivio de la indigestión causada por acidez, plenitud estomacal y paralización estomacal asociada a estos síntomas.

POSOLOGÍA

Para el tratamiento de la hipocalcemia: 3 capletas al día.
Para el tratamiento y profilaxis de la osteoporosis: 3 capletas al día o según criterio médico.
Para el tratamiento de la indigestión: 1 ó 2 capletas al día o según criterio médico.

CONTRAINDICACIONES

CARBO-C® está contraindicado en caso de hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.



EFEKTOS ADVERSOS

Flatulencia, constipación, náuseas. En caso de tratamientos prolongados o dosis muy elevadas, puede observarse hipercalcemia e hipocalciuria, así como hipofosfatemia.

INTERACCIONES

El calcio puede reducir la absorción oral de tetraciclinas y fenitoína, si se administra en forma concomitante las primeras 3 horas. El calcio puede reducir la respuesta a los bloqueadores de los canales de calcio y en altas dosis incrementa el riesgo de arritmias cardíacas en pacientes digitalizados. La captación intestinal del calcio, puede ser disminuida por la ingesta simultánea de algunos alimentos (p ej. espinacas, ruibarbo, salvado, otros cereales, leche y productos lácteos). La administración concomitante con estrógenos puede aumentar la absorción del calcio. Deberá de administrarse dos horas después del etidronato para prevenir la baja absorción de este último. No se deberá de administrar con antiácidos que contengan magnesio.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Este producto no debe administrarse en casos de hipercalcemia, hipocalciuria grave y en casos de insuficiencia renal grave.

MEDIDAS ADOPTADAS EN CASO DE INTOXICACIÓN

En caso de intoxicación acudir al centro médico más cercano. Los síntomas son reacciones gastrointestinales y (prácticamente sólo en pacientes que reciben altas dosis de vitamina D) signos y síntomas de hipercalcemia, como pueden ser disminución del apetito, náusea, vómito, estreñimiento, dolor abdominal, debilidad muscular, poliuria, sed, somnolencia y confusión; en casos severos puede haber convulsiones, coma o arritmias cardíacas.

Tratamiento: Interrupción de la ingesta del medicamento; en hipercalcemia severa, infusión I.V. de soluciones de cloruro de sodio, diuresis forzada, fosfato oral, corticosteroides.

PRESENTACIONES

CARBO-C® 500: se presenta en frasco contenido 60 capletas.

CONSERVACIÓN

Protéjase de la luz. Conservar a temperatura ambiente entre 15 °C- 30 °C. Protegido de la humedad.

LEYENDA DE PROTECCIÓN

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. Venta libre sin receta médica.



Fabricado por:

Grob Pharma Corp., Santo Domingo, Rep. Dom.
 Para: LAM, S.A., Santo Domingo, Rep. Dom.

