

**GLIPOX®**  
Vildagliptina  
Vía oral



FÓRMULA	GLIPOX® 50 Comprimido recubierto
Vildagliptina	50 mg
Excipiente c.s.p	1 Comp.

### DESCRIPCIÓN

La vildagliptina es un inhibidor de la dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4). La DPP - 4 a su vez es un potente inhibidor de las incretinas (GLP-1 y GIP) quienes a su vez aumentan la secreción de insulina; por ende su inhibición conduce a un aumento de la insulina.

### INDICACIONES

La vildagliptina pertenece a un grupo de medicamentos llamados antidiabéticos orales. Este medicamento se utiliza para tratar pacientes con diabetes tipo 2 cuando la diabetes no puede controlarse únicamente por la dieta y el ejercicio. Ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre. La diabetes tipo 2 aparece si el organismo no produce suficiente insulina o si la insulina producida no funciona adecuadamente. También puede aparecer si el organismo produce demasiado glucagón.

### POSOLOGÍA

La dosis de este medicamento que debe tomar cada persona varía dependiendo de su estado. Su médico le indicará exactamente el número de comprimidos que debe tomar. La dosis normal de GLIPOX® es 50 mg una vez al día por la mañana, noche si está tomando vildagliptina con otro medicamento conocido como metformina o una glitazona. Su médico le recetará vildagliptina junto con otro medicamento para controlar los niveles de azúcar en sangre.

### CONTRAINDICACIONES

Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a la sustancia activa o a cualquiera de los excipientes. Este medicamento no es un sustituto de la insulina en pacientes que requieran insulina y no debe utilizarse en pacientes con diabetes de tipo 1 o para el tratamiento de la cetoacidosis diabética.

No debe utilizarse en pacientes con insuficiencia hepática, incluyendo pacientes con valores de las enzimas hepáticas ALT o AST > 3 x valores máximos normales. Se han reportado casos raros de disfunción hepática (incluyendo hepatitis).

### EFFECTOS ADVERSOS

Algunos pacientes sufrieron los siguientes efectos adversos mientras tomaban vildagliptina:

- Frecuentes: temblor, dolor de cabeza, mareos, náuseas, disminución de la glucosa en sangre.
- Poco frecuente: fatiga

Algunos pacientes sufrieron los siguientes efectos adversos mientras tomaban vildagliptina y una sulfonilureas:

- Frecuentes: temblor, dolor de cabeza, mareos, debilidad, disminución de la glucosa en sangre.
- Poco frecuentes: estreñimiento.

### INTERACCIONES

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los productos de plantas medicinales o los adquiridos sin receta.

Su médico puede cambiar su dosis de vildagliptina si está tomando otros medicamentos (tales como tiazida, corticosteroides, productos para la tiroides y ciertos productos que afectan al sistema nervioso). Puede tomar este medicamento con o sin comida.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

La composición de las distintas presentaciones puede variar de un país a otro. Le recomendamos que consulte la información proporcionada por su proveedor local. No use vildagliptina si es alérgico (hipersensible) a este principio activo o a cualquiera de los demás componentes de la especialidad farmacéutica que le han recetado.

### MEDIDAS ADOPTADAS EN CASO DE INTOXICACIÓN

En caso de intoxicación acudir al centro médico más cercano. La información sobre la sobredosis de vildagliptina es limitada.

### Síntomas

Se han reportado casos de sintomatologías donde se ha obtenido información sobre los dichos síntomas probables en caso de sobredosis a partir de un estudio de tolerabilidad con dosis crecientes de vildagliptina en pacientes voluntarios sanos durante 10 días continuos, de presentar algunos favor contactar a su médico (dolor de cabeza fuerte, edema, fiebre, etc.).

### PRESENTACIÓN


**GLIPOX® 50:** se presenta en caja conteniendo 30 comprimidos recubiertos.

### CONSERVACIÓN

Protéjase de la luz. Conservar a temperatura ambiente entre 15°C-30°C. Protegido de la humedad.

### LEYENDA DE PROTECCIÓN

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. Venta bajo receta médica.



Fabricado por: **Grob Pharma Corp.**, Santo Domingo, Rep. Dom.  
Para: **LAM, S.A.**, Santo Domingo, Rep. Dom.

